



BIJLAGE 13.7 - ASSESSMENT FYSISCH ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK - OPGRAVING
BOUWTERSEM OLV-KERK - 2023-0164

IND	Werkput	Vlak	Spoor	Bewaring	Fragmentatie	% aanwezig	Geslacht	Geslachts-indicatoren	Leeftijd	Algemene leeftijds-categorie	Specifieke leeftijds-categorie	Pathologieën	Categorie patho	Tanden aanwezig?	Opmerkingen	Selectie?
1	1	2	1009	zeer goed	Laag	25-50	M?	schedel, mandible	>18	Adult	Adult	annular rings				X
2	1	6	1008	Goed	Hoog	25-50	/	/	/	Adult?	Adult?	grootte				/
3	1	6	1010	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>15	Adult?	Adult?	femur, grootte				/
4	1	3	1012	Goed	Laag	75-100	/	subadult	12-18	subadult	Adolescent	epifysen open, grootte, M3 niet onder oppervlakte				X
5	1	4	1013	Goed	Laag	50-75	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
6	1	4	1014	Goed	Laag	50-75	V?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle	000	artropathie	samen met kind IND13 begraven	X
7	1	4	1015	Zeer goed	Geen	75-100	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle		X	verspreid over gehele skelet koperverkleuring	X
8	1	3	1016	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia			voeten samen gekneper, mogelijk ijkwade	/
9	1	3	1017	Goed	Gemiddeld	25-50	M?	pelvis	>19	Adult	Adult	ribhoofden				X
10	1	6	1019	Goed	Gemiddeld	0-25	/	/	>15	Adult?	Adult?	fibula, grootte				/
11	1	4	1022	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>15	Adult?	Adult?	proximal tibia, grootte				/
12	1	3	1023	Goed	Laag	25-50	V?	schedel, mandible	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
13	1	4	1014	Goed	Gemiddeld	25-50	/	subadult	12-16	Subadult	Adolescent	M2 aanwezig, M3 nog geen wortel			samen met vrouw IND6 begraven	X
14	1	5	1024	Goed	Gemiddeld	50-75	/	subadult	11-15	Subadult	Adolescent	glenoid open, M2 aanwezig				X
15	1	5	1025	Goed	Gemiddeld	50-75	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle			opmerkelijke zwarte verkleuring binnenzijde beenderen	X
16	1	5	1026	Goed	Gemiddeld	0-25	/	/	>11	Adult?	Adult?	voet				/
17	2	1	2003	Goed	Gemiddeld	25-50	/	subadult	4-6	Subadult	Kind	M1 aan het doorkomen				X
18	1	4	1027	Goed	Gemiddeld	50-75	V?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle			mogelijk fragmenten van dit individu bij los bot IND5	X
19	1	4	1028	Slecht	Hoog	0-25	/	/	/	Adult?	Adult?	grootte				X
20	1	4	1029	Slecht	Hoog	0-25	/	/	/	/	/	/				/
21	2	2	2004	Zeer goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
22	2	3	2005	Zeer goed	Laag	25-50	M?	schedel, mandible	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
23	2	3	2006	Goed	Laag	25-50	/	subadult	<8	Subadult	Kind	geen fuseringen pijpbeenderen (femur, tibia, ischio-pubic ramus), grootte				X
24	2	3	2007	Zeer goed	Laag	50-75	?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
25	2	4	2009	Goed	Laag	50-75	V?	pelvis	>19	Adult	Adult	ribhoofden			verstoord mogelijk ouder graf, collectieve bijzetting?	X
26	2	5	2010	Goed	Laag	0-25	/	/	>11	Adult?	Adult?	voet, grootte				/
27	2	5	2011	Goed	Laag	50-75	M?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
28	2	6	2012	Goed	Laag	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
29	2	6	2013	Goed	Gemiddeld	50-75	V?	pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest				X
30	2	6	2014	Goed	Gemiddeld	50-75	M?	pelvis, robuustheid	>18	Adult	Adult	iliac crest				X
31	2	7	2016	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>15	Adult?	Adult?	femur				X
32	2	3	2018	Goed	Gemiddeld	25-50	/	subadult	<8	Subadult	Kind	ischio-pubic ramus, grootte				X
33	2	2	2021	Goed	Laag	50-75	/	subadult	0-1	Subadult	baby	mandible aan het fuseren				X
34	2	3	2023	Goed	Laag	25-50	M?	pelvis	>17	Adult	Adult	tibia			buikigger	X
35	2	4	2019	Goed	Laag	0-25	V?	schedel	>22	Adult	Adult	jagular synchondrosis		Andere	doorsneed mogelijk een ouder graf, collectieve bijzetting?	X
36	2	4	2022	Goed	Gemiddeld	25-50	V?	schedel, mandible	>21	Adult	Adult	medial clavicle	hoog antemortem tandverlies	Gebit	doorsneed mogelijk een ouder graf, collectieve bijzetting?	X
37	2	5	2026	Goed	Laag	75-100	V?	mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle	xiphoid gefuseerd, thyroid verbeend	Andere	doorsneed mogelijk een ouder graf, collectieve bijzetting?	X
38	2	5	2025	Goed	Laag	25-50	V?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				/
39	2	5	2027	Goed	Laag	0-25	/	/	>15	Adult?	Adult?	distal fibula, grootte				/
40	2	5	2024	Goed	Gemiddeld	0-25	/	subadult	<6	Subadult	Kind	M1 niet doorgelkomen				/
41	2	4-6	2020	Goed	Laag	75-100	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle	thyroid verbeend en xiphoid gefuseerd	Andere		X
42	2	6	2036	Goed	Laag	0-25	V?	pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest				/
43	2	6	2035	Slecht	Hoog	25-50	/	subadult	<6	Subadult	kind	grootte, M1 niet volledig doorgelkomen			vulling duidt op ouder graf	X
44	2	6	2037	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>21	Adult	Adult	medial clavicle				/
45	2	6	2028	Matig	Gemiddeld	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
46	2	5	2031	Slecht	Gemiddeld	0-25	/	/	/	/	/	/			houdt mogelijk verband met skelet uit proefputonderzoek	/
47	2	6	2038	Goed	Gemiddeld	25-50	/	subadult	<18	Subadult	Adolescent	grootte, femur en tibia los			ijkwade afgeleid van sarnengeknepen beren, knieën en voeten, vulling duidt op ouder graf	X
48	2	7-8	2039	Slecht	Hoog	25-50	/	/	>15	Adult?	Adult?	humerus en kop femur gefuseerd				/
49	2	2	2040	Goed	Laag	0-25	/	subadult	7-18 maanden	Subadult	baby	lengte clavicle (57mm)				X
50	2	2	2041	Zeer goed	Laag	50-75	/	subadult	10-15	Subadult	adolescent	humerus niet gefuseerd, 2de molaar aan het doorkomen				X
51	2	2	2042	Goed	Laag	0-25	/	subadult	<1	Subadult	baby	mandible open		X		/
52	2	2	2043	Goed	Gemiddeld	0-25	/	subadult	<1	Subadult	baby	mandible open, radius 58 mm		X		/
53	2	2	2044	Goed	Gemiddeld	0-25	/	subadult	<1	Subadult	baby	mandible open		X		/
54	2	2	2045	Goed	Gemiddeld	25-50	/	subadult	/	Subadult	baby	grootte		X		X
55	2	3	2046	Zeer goed	Gemiddeld	50-75	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
56	2	3	2047	Zeer goed	Laag	50-75	/	subadult	4-8	Subadult	Kind	M1 aanwezig, M2 niet	Begoben onderbenen, rickets?, abnormale porosie schedel	stofwisseling	X	X
57	2	4	2048	Goed	Laag	25-50	V?	pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest				X
58	2	4	2049	Goed	Gemiddeld	0-25	M?	schedel, mandible	>21	Adult	Adult	medial clavicle				/
59	2	3	2050	Goed	Gemiddeld	50-75	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
60	2	4	2051	zeer goed	Laag	75-100	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
61	2	5	2052	Goed	Gemiddeld	50-75	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
62	2	5	2053	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
63	2	4	2054	Goed	Gemiddeld	25-50	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
64	2	5	2055	Goed	Laag	50-75	/	subadult	10-15	Subadult	Adolescent	Pijpbeenderen los, M2 aanwezig				X
65	2	5	2056	Goed	Gemiddeld	25-50	V?	schedel, mandible	11-16	Subadult	Adolescent	M3 aan het doorkomen, alle epifysen los, radius, humerus en medial clavicle)				X
66	2	5	2057	Goed	Gemiddeld	0-25	M?	schedel, mandible	17-20	Adult	Adult	proximal humerus open, M3 aanwezig				/
67	2	6	2058	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
68	2	6	2059	Goed	Laag	50-75	V?	schedel, mandible, pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest				X
69	2	6	2060	Goed	Gemiddeld	75-100	V?	schedel, mandible, pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest				X
70	2	6-7	2061	Goed	Gemiddeld	25-50	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X
71	2	6-7	2062	Goed	Gemiddeld	75-100	V?	schedel, mandible, pelvis	17-30	Adult	Adult	tibia volledig, medial clavicle open, M3 niet aanwezig)				X
72	2	6	2063	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia				/
73	2	7	2064	Goed	Laag	25-50	V?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle				X



BIJLAGE 13.7 - ASSESSMENT FYSISCH ANTROPOLOGISCH ONDERZOEK - OPGRAVING
BOUSERSEM OLV-KERK - 2023-0164

IND	Werkput	Vlak	Spoor	Bewaring	Fragmentatie	% aanwezig	Geslacht	Gefachts-indicatoren	Leeftijd	Algemene leeftijdscategorie	Specifieke leeftijdscategorie	Leeftijds-indicatoren	Pathologieën	Categorie patho	Tanden aanwezig?	Opmerkingen	Selectie?
74	2	8	2065	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
75	2	7	2067	zeer goed	Gemiddeld	0-25	/	/	/	Adult?	Adult?	grootte (epifysen niet bewaard)					/
76	2	3	2070	Goed	Laag	50-75	M?	pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle	overmatige osteofytose wervelkolom, DISH?	stofwisseling			X
77	2	3	2071	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
78	2	3	2072	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
79	2	4	2073	Goed	Laag	25-50	M?	pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest					X
80	2	4	2069	Goed	Laag	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
81	2	4	2074	Goed	Gemiddeld	0-25	M?	mandible	>21	Adult	Adult	medial clavicle					/
82	2	5	2075	Goed	Laag	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
83	2	5	2077	Goed	Laag	75-100	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle					X
84	2	5	2078	Goed	Laag	50-75	M?	pelvis, robuustheid	>18	Adult	Adult	iliac crest					X
85	2	5-6	2033	Zeet goed	Laag	75-100	M?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle					X
86	2	5	2079	Goed	Laag	25-50	V?	lengte pijpbeenderen en losse pelvis die vermoedelijk bij deze context hoort	>17	Adult	Adult	tibia					X
87	2	6	2080	Zeet goed	Laag	50-75	V?	pelvis	>18	Adult	Adult	iliac crest					X
88	2	6	2081	Goed	Gemiddeld	0-25	/	/	/	/	/	/					/
89	2	7-8	2084	Goed	Gemiddeld	75-100	V?	schedel, mandible, pelvis	>21	Adult	Adult	medial clavicle					X
90	2	7	2085	Goed	Hoog	25-50	/	/	>15	Adult?	Adult?	femur					/
91	2	7-8	2086	Goed	Laag	50-75	M?	schedel, mandible, pelvis	15-18	Subadult	Adolescent	epifyses open maar 3de molaar komt naar boven					X
92	2	7-8	2087	Matig	Gemiddeld	0-25	/	subadult	11-18	Subadult	Adolescent	grootte, epifyses femur los					/
93	2	6	2088	Goed	Laag	0-25	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					/
94	2	8	2066	Matig	hoog	50-75	/	/	>15	Adult?	Adult?	femur					X
95	2	6	2083	Goed	Gemiddeld	25-50	/	/	>17	Adult	Adult	tibia					X
96	3	5	3003	zeet goed	Laag	0-25	V?	pelvis, graciliteit	>18	Adult	Adult	iliac crest					/
97	3	1	3004	zeet goed	Laag	25-50	/	subadult	4-8	subadult	Kind	M1 aan het doorkomen					X
98	2	5	2030	zeet goed	Laag	50-75	/	subadult	12-18	subadult	Adolescent	Ulna aan het fuseren					X